


¿Por qué no puedo recibir todavía la vacuna frente a la viruela del mono?

En este infográfico te
explicamos por qué
se está priorizando
en la campaña de
vacunación



- **Frenar el avance de la viruela del mono es una responsabilidad de todas y todos**
- **Vacunarte te ayudará a proteger tu salud y la de los demás**



- **Las autoridades sanitarias han emitido unas recomendaciones de vacunación a partir de la evidencia disponible**
- **La recomendación es lo suficientemente amplia como para que puedan recibir la vacuna todas las personas mayores de 18 años expuestas a un mayor riesgo de adquirir la viruela del mono**



- Sin embargo, en Europa, en el momento actual, la disponibilidad de dosis de la vacuna es limitada
- El número de personas beneficiarias es mayor que el número de dosis disponibles



- La disponibilidad limitada de dosis afectará al despliegue de la campaña de vacunación



- No todas las personas incluidas en la recomendación de vacunación podrán recibir la vacuna de forma inmediata

Las autoridades sanitarias han tenido que priorizar a aquellas personas que tienen un mayor riesgo de exposición



Recomendaciones de vacunación en el brote actual de viruela del mono

Aprobado por la Comisión de Salud Pública en la reunión mantenida el 12 de julio de 2022

Ante la disponibilidad limitada de dosis de vacunas frente a la viruela del mono se prioriza por este orden:

1) Vacunación previa a la exposición (profilaxis preexposición). Las personas deben cumplir los siguientes requisitos:

- Personas de 18 a 45 años de edad que mantengan prácticas sexuales de alto riesgo
- No haber recibido la vacuna con anterioridad
- No presentar alguna de las contraindicaciones para la vacunas en general

**¡PRIORIZACIÓN
VACUNA VIRUELA
DEL MONO!**



2) Vacunación tras la exposición (profilaxis post-exposición). Las personas deben cumplir los siguientes requisitos:

- Contactos estrechos de casos confirmados (incluidos contactos sexuales)
- Personal sanitario y de laboratorio en contacto estrecho con casos confirmados y con incidencia en el uso de EPI




En un contexto de disponibilidad limitada de vacunas, priorizar permite garantizar que las personas más vulnerables a contraer la viruela del mono se vacunan primero.




La vacunación requiere dos dosis administradas con una separación de, como mínimo, 28 días. La persona comenzará a desarrollar protección durante los días y las semanas siguientes a la primera dosis, pero logrará la inmunidad completa dos semanas después de recibir la segunda dosis.

La segunda dosis de la vacuna se podría administrar más allá de las cuatro semanas.


Por esta razón, algunos países están retrasando la administración de la segunda dosis para poder vacunar al mayor número de personas con la primera dosis y así tener al máximo número posible de personas beneficiarias de la vacuna con cierta protección frente a la viruela del mono.



Población beneficiaria de la vacuna frente a la viruela del mono



Población beneficiaria de la vacuna frente a la viruela del mono con la primera dosis



Población beneficiaria de la vacuna frente a la viruela del mono con la primera dosis

Mientras esperas tu turno de vacunación, puedes hacer varias cosas para proteger tu salud y la de los demás



**Infórmate de la
viruela del
mono y sus
síntomas**




**Evita el contacto estrecho y
sexual con personas con
síntomas de viruela del
mono**



**Tómate un descanso
de fiestas y eventos
multitudinarios que
impliquen contacto
estrecho**



**Si sospechas que
puedes haberla
adquirido, ponte en
contacto con tu
centro de salud**



**Comparte esta
información
con tus contactos y
redes sociales**



**Si necesitas más información sobre la viruela del mono,
contáctanos y responderemos tus dudas**



+34 679 969 141



consultas@gtt-vih.org



+34 679 969 141



gtt.vih



gttvih



www.gtt-vih.org